

Carbo-Taxol[®] kuur



FUNDASHON **M**ARIADAL



Inleiding

U heeft in overleg met uw specialist besloten om u binnenkort te laten behandelen met cytostatica (chemokuur).

Deze behandeling houdt in dat u gedurende een langere periode een kuur gaat volgen met medicijnen die de celdeling remmen.

Aangezien u veel informatie ontvangt, is het niet eenvoudig om alles in één keer te onthouden. Daarom is deze informatie opgeschreven, zodat u thuis alles nog eens rustig kunt nalezen.

Hoe worden medicijnen toegediend en hoe vaak?

De Carbo-Taxol®-kuren worden wekelijks toegediend, uw arts zal deze keuze maken afhankelijk van uw algemene conditie.

Aangezien de behandeling invloed kan hebben op uw bloedwaarden zal vooraf steeds bloed worden afgenomen. Hoe en wanneer dit gebeurt, zal door de behandelende arts met u worden besproken.

Met welke bijwerkingen moet ik rekening houden?

Als u last van bijwerkingen hebt, geef dat dan door aan de verpleegkundige bij de volgende kuur. Mogelijk kan er iets aan worden gedaan.

Wanneer u vragen en/of klachten hebt, kunt u contact opnemen met het de oncologieverpleegkundige. Bereikbaar op kantoordagen/uren op nummer: 780 0493.

Mogelijke bijwerkingen

- De aanmaak van bloedcellen in het beenmerg kan tijdelijk worden geremd. Als gevolg daarvan kunt u vatbaar worden voor infecties en bloedarmoede krijgen. U kunt sneller blauwe plekken en/of een bloedneus krijgen.
- Deze therapie kan tijdelijke vermoeidheid veroorzaken.
- Verminderde eetlust.
- Deze therapie kan misselijkheid en braken veroorzaken.
- Uw smaak kan tijdelijk veranderen.
- Het slijmvlies van de mond kan ontstoken raken. U kunt daardoor blaasjes en pijn in de mond krijgen. Een goede mondverzorging is belangrijk.
- Het slijmvlies van de darm kan geïrriteerd raken en daardoor diarree/obstipatie veroorzaken.
- Bij deze behandeling volgt steeds volledig haarverlies.
- De therapie kan griepachtige verschijnselen geven.
- Deze therapie kan spier- en zenuwpijnen veroorzaken.
- U kunt vocht opstapelen. Uw gewicht kan hierdoor toenemen.
- Deze therapie kan invloed hebben op de seksualiteit, vruchtbaarheid en menstruatie. De mate waarin dat gebeurt is van vele factoren afhankelijk. Praat hierover met uw verpleegkundige en/of arts.



Er zijn een aantal redenen om direct de arts/ oncologieverpleegkundige of het ziekenhuis te bellen. Zie het formulier 'Redenen om de oncologieverpleegkundige/arts te bellen.'

Vragen?



Heeft u nog vragen over de informatie in deze folder dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met de oncologieverpleegkundige op telefoonnummer: 780 0493.

Innameschema voor de patiënt

Tijd op de dag	Dag 1			Dag 2			Dag 3			Dag 4			Dag 5					
	8h	12	20	8h	12	20	8h	12	20	8h	12	20	8h	12	20			
	Zo nodig																	
Anti-miselijk	Granisetron tabl. á 1 mg.			1			1			1			1			1		
	Primperan tabl. á 10 mg.			1			1			1			1			1		
Chemotherapie	Carboplatin Paclitaxel																	

Groen = tabletten innemen
Wit = Tabletten zo nodig innemen bij misselijkheid



FUNDASHON **M**ARIADAL

Versie 12-2022