


Tratamiento con Carbo-Taxol®



FUNDASHON **M**ARIADAL



Introducción

En consulta con su especialista, ha decidido que pronto será tratado con citostáticos (quimioterapia). Este tratamiento consiste en tomar durante un período prolongado un conjunto de medicamentos que inhiben la división celular.

Dado que recibe mucha información, no es fácil recordarlo todo a la vez. Por lo tanto, esta información está escrita para que pueda revisarla en casa.

¿Cómo se administran los medicamentos y con qué frecuencia?

Los tratamientos con Carbo-Taxol® se administran semanalmente; su médico tomará esta decisión en función de su estado general.

Como el tratamiento puede afectar a sus valores sanguíneos, siempre se le extraerá sangre previamente. Su médico tratante le explicará cómo y cuándo se hace esto.

¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta?

Si experimenta algún efecto secundario, comuníquese a la enfermera en su próximo tratamiento. Puede que sea posible hacer algo al respecto.

Si tiene alguna pregunta y/o molestia, póngase en contacto con la enfermera de oncología. Disponible en días/horas de oficina en: 780 0493.

Posibles efectos secundarios

- La producción de células sanguíneas en la médula ósea puede inhibirse temporalmente. En consecuencia, puede ser susceptible de contraer infecciones y sufrir anemia. Es posible que le salgan moratones y/o le sangre la nariz más rápidamente.
- Esta terapia puede provocar una fatiga temporal.
- Disminución del apetito.
- Esta terapia puede causar náuseas y vómitos.
- Su gusto puede cambiar temporalmente.
- La membrana mucosa de la boca puede inflamarse. Como resultado, puede experimentar ampollas y dolor en la boca. Una buena higiene bucal es importante.
- La membrana mucosa del intestino puede irritarse provocando diarrea/estreñimiento.
- Este tratamiento siempre resulta en la pérdida completa del cabello.
- La terapia puede provocar síntomas similares a los de la gripe.
- Esta terapia puede causar dolores musculares y nerviosos.
- Puede acumular líquidos. Su peso puede aumentar como resultado.
- Esta terapia puede afectar a la sexualidad, la fertilidad y la menstruación. El alcance depende de muchos factores. Hable con su enfermera y/o su médico sobre esto.



Hay varias razones para llamar al médico/enfermera de oncología o al hospital inmediatamente. Consulte el folleto “Razones para llamar a la enfermera/médico de oncología”

Horario de ingesta para el paciente

Hora del día	Dia 1						Dia 2						Dia 3						Dia 4						Dia 5											
	8h		12		20		8h		12		20		8h		12		20		8h		12		20		8h		12		20							
	si es necesario																		si es necesario						si es necesario											
Antináuseas	Granisetron comp. de 1 mg.						1						1						1						1						1					
	Primperan comp. de 10 mg.						1						1						1						1						1					
Quimioterapia	Carboplatin																																			
	Paclitaxel																																			

Verde = tomar comprimidos.

Blanco = tomar comprimidos si es necesario en caso de náuseas.



FUNDASHON **M**ARIADAL

Publicación 12-2022