

# Docetaxel (Taxotere<sup>®</sup>) kuur



FUNDASHON **M**ARIADAL

## Inleiding

Chemotherapie met Docetaxel verlicht de pijn van de tumor of de uitzaaiingen. Het kan uw levensduur verlengen en symptomen en klachten verminderen. Eén keer in de 3 weken dienen we Docetaxel bij u toe. Dit doen we via een infuus. Daarnaast krijgt u medicijnen die ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk last heeft van de bijwerkingen.



## Voor de behandeling

Voordat u begint met de chemotherapie zijn een aantal voorbereidingen nodig. Zo krijgt u een informatiesprek over de behandeling. Daarnaast controleert de arts uw bloed. Eén of 2 dagen van tevoren moet u bloed laten prikken om de bloedwaarden te controleren. De behandeling kan alleen doorgaan wanneer de bloedwaarden goed zijn. Soms krijgt u aanvullende medicijnen als ondersteunende behandeling.



## **De behandeling (wat kunt u verwachten?)**

Een verpleegkundige bespreekt met u hoe het de afgelopen 3 weken is gegaan. Het is belangrijk dat u alle mogelijke bijwerkingen meldt die u heeft gehad. Daarna prikken we een infuus in uw arm. We sluiten de Docetaxel® aan, waarna het middel via een ader uw lichaam in loopt. Als alle vloeistof in uw lichaam zit, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Daarna kunt u naar huis. De behandeling in totaal duurt ongeveer 1,5 uur. De eerste keer dat u Docetaxel® via het infuus krijgt, wordt de bloeddruk regelmatig gemeten.

## **Met welke bijwerkingen moet ik rekening houden?**

Als u last van bijwerkingen hebt, geef dat dan door aan de verpleegkundige bij de volgende kuur. Mogelijk kan er iets aan worden gedaan.

Wanneer u vragen en/of klachten hebt, kunt u contact opnemen met het de oncologieverpleegkundige. Bereikbaar op kantoordagen/uren op nummer: 780 0493.

## Mogelijke bijwerkingen

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- Haaruitval.
- Misselijkheid en braken.
- Smaakverandering.
- Invloed op de werking van het beenmerg.
- Diarree.
- Obstipatie (harde ontlasting en/of verstopping).
- Allergische reactie.
- Irritatie en/of ontsteking van het mondslijmvlies.
- Spierpijn.
- Tintelingen en doof gevoel in vingertoppen en tenen.
- Vermoeidheid/verminderde energie.
- Verkleuring van huid en nagels.
- Invloed op seksualiteit.
- Vocht vasthouden.



Er zijn een aantal redenen om direct de arts/ oncologieverpleegkundige of het ziekenhuis te bellen. Zie het formulier 'Redenen om de oncologieverpleegkundige/arts te bellen.'

## Vragen?



Heeft u nog vragen over de informatie in deze folder dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met de oncologieverpleegkundige op telefoonnummer: 780 0493.





**F**UNDASHON **M**ARIADAL

Versie 12-2022