

# Inyecciones de Herceptin<sup>®</sup>



(Trastuzumab)



FUNDASHON MARIADAL



## ¿Qué es Herceptin?

Herceptin contiene un principio activo llamado Trastuzumab. La ventaja de este tratamiento es que inhibe principalmente las células malignas en su crecimiento sin causar mucho daño a las células sanas del cuerpo. Por lo tanto, experimentará menos efectos secundarios durante este tratamiento que con la quimioterapia.

Como se estimula el sistema inmunitario, también se denomina inmunoterapia.



## ¿Cómo se administra Herceptin?

Herceptin se administra bajo la piel (por vía subcutánea) en el muslo o en el pliegue abdominal. Preferiblemente, el sitio se alterna cada vez. La administración dura unos 5 minutos, el producto es incoloro y puede provocar una ligera sensación de hormigueo local al principio y/o al final.

La terapia se administra cada 3 semanas durante 1 año o 18 administraciones. Se realizará una ecografía del corazón cada 3 meses.



## Advertencias sobre el uso de Herceptin

¿Cuándo no debe utilizar este medicamento?

- Es alérgico al Trastuzumab (el principio activo de Herceptin).
- Tiene problemas respiratorios graves en reposo debido a su cáncer o necesita la administración de oxígeno.
- Si está embarazada y/o en periodo de lactancia.

Informe a su médico, enfermera o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, no solo de los que le han recetado sino también de los que ha comprado sin receta.

## Posibles efectos secundarios

Si experimenta algún efecto secundario, comuníquese a la enfermera en el siguiente tratamiento. Puede que sea posible hacer algo al respecto.

Hay una serie de razones para llamar al médico/enfermera de oncología o al hospital inmediatamente. Vea el formulario "Razones para llamar a la enfermera/médico de oncología".

Tras la administración de Herceptin, pueden producirse reacciones como fiebre, dificultades respiratorias, escalofríos, erupción cutánea y descenso de la presión arterial. Estos síntomas son temporales.

### Lo que podrá observar:

- Dolor muscular (a menudo en las piernas).
- Dolor a nivel de articulaciones y huesos.
- Dolor de cabeza.
- A veces, fiebre y escalofríos.

- Reacciones cutáneas locales:
  - La administración subcutánea de Herceptin puede causar una reacción cutánea local. Esta reacción puede manifestarse de diferentes maneras. Puede producirse una hinchazón local en el lugar de la inyección y puede experimentar una ligera sensación de hormigueo al principio y al final de la inyección.
- Problemas cardíacos
  - El tratamiento que recibe puede afectar a su corazón. Las células musculares pueden resultar dañadas, reduciendo la función del músculo cardíaco. Esto reduce la potencia de bombeo del corazón o hace que lata de forma irregular.

## Preguntas?



Si tiene más preguntas sobre el tratamiento con inyecciones de Herceptin, póngase en contacto con la enfermera de oncología en días laborables durante el horario de oficina en el número de teléfono: 780 0493.



**F**UNDASHON **M**ARIADAL

Edición 12-2022