

Palbociclib/ Faslodex behandeling



FUNDASHON MARIADAL

Inleiding

Palbociclib wordt toegediend aan patiënten met een lokaal gevorderde of uitgezaaide borstkanker. Palbociclib wordt gecombineerd met een anti-hormonale behandeling met spuiten (Faslodex®). Uw arts zal u adviseren voor welke behandeling u in aanmerking komt.



Hoe verloopt de behandeling?

Eén cyclus van de behandeling met Palbociclib bedraagt 28 dagen (of 4 weken). U dient de medicatie 3 weken in te nemen, gevolgd door 1 week rust. In de rustweek neemt u geen Palbociclib in.

Gedurende de eerste 2 cyclussen moet er af en toe bloed worden geprikt:

- Voor de start van de behandeling.
- Op dag 14 (2 weken na de start).

Vanaf cyclus 3 is meestal alleen aan de start van elke behandeling een bloedafname nodig.

De injectie (Faslodex) wordt 1 keer per 2 weken gegeven in de eerste cyclus, daarna om de 4 weken.

Deze injectie krijgt u in de bilspier ingespoten. Bij voorkeur wordt steeds afgewisseld van plaats. De toediening duurt ongeveer 2-3 min, de dosering is verdeeld over 2 spuitjes.

Hoe neem ik het geneesmiddel in?

- U neemt 1x per dag 1 capsule Palbociclib gedurende 3 weken, gevolgd door 1 week rust. In de rustweek neemt u geen Palbociclib.
- Om de hoeveelheid Palbociclib in uw bloed stabiel te houden, is het aan te bevelen om het medicijn steeds op hetzelfde tijdstip in te nemen.
- Palbociclib moet steeds bij de maaltijd worden ingenomen.
- Slik de capsules in zijn geheel in met een glas water, zonder kauwen.

Mogelijke bijwerkingen

Als u last hebt van bijwerkingen, geef dat dan bij de volgende kuur door aan de verpleegkundige. Mogelijk kan er iets aan worden gedaan.

U kunt contact opnemen (tijdens kantooruren) met de oncologieverpleegkundige/ op het volgende nummer: 780 0493.

Meestal wordt Fulvestrant goed verdragen. Bijwerkingen die kunnen voor komen zijn:

- Pijn of een blauwe plek op de plaats van de injectie.
- Overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, slaapproblemen, vermoeidheid, concentratiestoornissen, stemmingsstoornissen, hoofdpijn, gewichtstoename, huid- en haarproblemen, droge vagina, libidoverlies, klachten van urineverlies.
- Spier- of gewrichtsklachten.
- Mogelijk heeft u iets meer kans op osteoporose (botontkalking).
- Misselijkheid.
- Trombose en hart- en vaatziekten.
- Fulvestrant geeft een licht verhoogd risico op een trombosebeen of een longembolie. Neem bij klachten contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist.



Er zijn een aantal redenen om direct de oncologieverpleegkundige/arts of het ziekenhuis te bellen. Zie het formulier 'Redenen om de oncologieverpleegkundige/arts te bellen.'

Vragen?



Heeft u nog vragen over de informatie in deze folder dan kunt u op werkdagen tijdens kantooruren contact opnemen met de oncologieverpleegkundige op telefoonnummer: 780 0493.



FUNDASHON **M**ARIADAL

Versie 12-2022