

Tratamiento con Palbociclib/ Faslodex



FUNDASHON MARIADAL

Introducción

Palbociclib se administra a pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico. Palbociclib se combina con un tratamiento antihormonal con inyecciones (Faslodex®). Su médico le indicará el tratamiento al que puede optar.



¿Cómo se desarrolla el tratamiento?

Un ciclo de tratamiento con Palbociclib dura 28 días (o 4 semanas). Debe ingerir los medicamentos durante 3 semanas, seguido de una semana de descanso. Durante la semana de descanso, usted no ingiere Palbociclib.

Durante los 2 primeros ciclos, se debe extraer sangre ocasionalmente:

- Antes del inicio del tratamiento.
- En el día 14 (2 semanas después del inicio).

A partir del ciclo 3, la extracción de sangre solo suele ser necesaria al inicio de cada tratamiento.

La inyección (Faslodex) se administra una vez cada 2 semanas en el primer ciclo, después cada 4 semanas.

Esta inyección se inyecta en el músculo glúteo. Es preferible alternar los sitios cada vez. La administración dura unos 2-3 minutos, la dosis se divide en 2 jeringas.

¿Cómo debo ingerir el medicamento?


- Usted debe ingerir 1 cápsula de Palbociclib una vez al día durante 3 semanas, seguida de 1 semana de descanso. Durante la semana de descanso, usted no ingiere Palbociclib.
- Para mantener estable la cantidad de Palbociclib en la sangre, se recomienda ingerir el medicamento siempre a la misma hora.
- Palbociclib debe ingerirse siempre con una comida.
- Trague las cápsulas enteras con un vaso de agua, sin masticar.

Posibles efectos secundarios

Si experimenta algún efecto secundario, comuníquese a la enfermera en su próximo tratamiento. Puede que sea posible hacer algo al respecto.

Puede ponerse en contacto (en horario de oficina) con la enfermera de oncología en el siguiente número: 780 0493.

Por lo general, Fulvestrant es bien tolerado. Los efectos secundarios que pueden aparecer son:

- Dolor o hematoma en el lugar de la inyección.
 - Molestias de la menopausia, como sofocos, problemas de sueño, fatiga, problemas de concentración, trastornos del estado de ánimo, dolor de cabeza, aumento de peso, problemas de piel y cabello, sequedad vaginal, pérdida de la libido, quejas de pérdidas de orina.
 - Molestias musculares o articulares.
 - Puede tener una probabilidad ligeramente mayor de padecer osteoporosis (osteoporosis de los huesos).
 - Náuseas.
 - Trombosis y enfermedades cardiovasculares.
 - Fulvestrant conlleva un ligero aumento del riesgo de trombosis de pierna o embolia pulmonar. En caso de molestias, póngase en contacto con su médico tratante o con el especialista en enfermería.
- 

Hay varias razones para llamar a la enfermera/médico de oncología o al hospital directamente. Para ello, consulte el formulario: “Motivos para llamar al médico/enfermera de oncología”.





FUNDASHON **M**ARIADAL

Publicación 12-2022